ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

AZACITIDINE

- Syndrome myélodysplasique – risque intermédiaire-2 ou élevé (IPSS)
- Leucémie myéloblastique aiguë (20-30 % de blastes et dysplasie de lignées multiples)

Durée approximative : **0,5 h**

Hospitalisé

Fréquence d'administration : **q 4 sem.**

Externe

Cycle : _____ à débiter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Kytril**[®] _____ mg PO, 60 min avant le début de la chimiothérapie (**Jours 1 à 7**).

Kytril[®] 1mg

AVEC

Decadron[®] _____ mg.

→ IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie
(**Jours 1 à 7**).

OU

Maxeran[®] _____ mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie.

Ativan[®] _____ mg SL avant la chimiothérapie.

B. CHIMIOTHÉRAPIE

Jours 1 à 7, du _____ au _____.

- **Azacitidine** (Vidaza[®]) _____ mg (75 mg/m²/jour) SC lentement x 7 jours*.

Administration :

- Administrer le médicament immédiatement après la préparation (stabilité = 45 minutes).
- Remettre le produit en suspension avant l'administration (rouler la seringue entre les mains pendant environ 30 secondes).
- Volume maximal de 4 ml par site d'injection.
- Seringue servie avec une aiguille neuve (26 ½ G) + 1 ml d'air pour diminuer le risque de réactions cutanées (maintenir l'air au sommet de la seringue et l'injecter à la toute fin).
- Choisir un site comportant le plus de tissu adipeux et éviter le tour de taille.
- Faire la rotation des sites d'administration et espacer les points d'injection d'au moins 5 cm.
- Pincer 2,5 cm de peau et maintenir le pincement tout au long de l'injection.
- Insérer l'aiguille à angle de 45-90 degrés (selon tissu adipeux et/ou élasticité de la peau).
- Ne pas injecter dans une région qui présente : sensibilité, induration, rougeur ou ecchymose.
- Exercer une légère compression sur le site d'injection x 10 min. suivant l'administration.
- Appliquer une compresse tiède ou fraîche au besoin, si réaction cutanée (ni froide ni chaude).

B. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)

Jours 1 à 7 (5-2 ou 2-5)*, du _____ au _____

Jour 1 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jour 2 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jour 3 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jour 4 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jour 5 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jour 6 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jour 7 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

* Le schéma posologique reconnu de l'Azacitidine consiste en 7 jours *consécutifs* d'administration. Pour faciliter l'administration, les doses de fin de semaine peuvent être reportées aux lundi et mardi suivants (5-2) ou devancées les jeudi et vendredi précédant la semaine d'administration (2-5).

C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Stemetil[®]** 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

Gravol[®] 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

Motilium[®] 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

D. AUTRES

Médecin

Pharmacien

Date