

## ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : \_\_\_\_\_ (kg) Poids maigre : \_\_\_\_\_ (kg)

Poids de dosage : \_\_\_\_\_ (kg) Taille : \_\_\_\_\_ (cm)

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

## PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

### BORTÉZOMIB

- Myélome multiple
- Lymphome non hodgkinien réfractaire des cellules du manteau

Durée approximative : **0,25 h**

Hospitalisé

Externe

Fréquence d'administration :  Régime standard : **q 3 sem.**  
 Régime hebdomadaire : **q 5 sem.**

Suivi formules sanguines :  Au jour 1 du cycle seulement  
 Avant chaque dose de bortézomib (si traitement prescrit d'avance, le traitement pourra être administré si les neutrophiles absolus sont  $\geq 1,5 \times 10^9/L$  et les plaquettes sont  $\geq 50 \times 10^9/L$ , sinon vérifier avec hémato-oncologue)

Cycle : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

#### A. ANTIÉMÉTIQUE PRÉTRAITEMENT

- **AUCUN** traitement antiémétique n'est requis **D'EMBLÉE**.

#### B. CHIMIOTHÉRAPIE

**Dexaméthasone** (Decadron®) 40 mg PO id (déjeuner) X 1 fois/sem. ou : \_\_\_\_\_

#### **REMARQUE :**

*Bortézomib (Velcade®) SC → Prendre au moins 1 pouce de gras et injecter à 90°. Si moins d'un pouce de gras, injecter à 45°. Si apparition de rougeur, éviter l'application de chaleur ou de glace au site d'injection.*

***Exceptionnellement** (ex. : patient oedématié +++, réaction cutanée majeure) le bortézomib (Velcade®) pourrait être donné IV si stipulé par le médecin. Le cas échéant, installer **un soluté NaCl 0,9 % IV GVO** et rincer la tubulure avec le NaCl 0,9 % après la fin de l'administration du bortézomib (Velcade®).*

*\* **Respecter un délai minimal de 72 h entre chaque dose de bortézomib (Velcade®).***

Régime standard

Jour 1, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes

**B. CHIMIOTHÉRAPIE** (suite)

Jour 4, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes.

Jour 8, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes.

Jour 11, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes.

**Régime hebdomadaire**

Jour 1, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes.

Jour 8, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes.

Jour 15, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes.

Jour 22, le \_\_\_\_\_

- **Bortézomib** (Velcade®) \_\_\_\_\_ mg (1,3 mg/m<sup>2</sup>) SC en 30 secondes.

**C. ANTIÉMÉTIQUES POST-TRAITEMENT**

- **Stemetil**® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

**Autres** (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

- Gravol**® 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

**D. AUTRES**

- **Imodium**® 2 mg. Si diarrhée : 2 co. immédiatement, puis 1 co. après chaque selle diarrhéique (max. 8 co./jour).

- Valtrex**® 500 mg PO DIE (poursuivre jusqu'à 4 semaines après la dernière dose de bortézomib)

\_\_\_\_\_  
Médecin

\_\_\_\_\_  
Pharmacien

\_\_\_\_\_  
Date