

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

CARBOPLATINE - GEMCITABINE

- Cancer du **poumon** non à petites cellules métastatique
- Cancer métastatique du **sein**

Durée approximative : **1,5 h (Jour 1)**

Hospitalisé

0,5 h (Jour 8)

Externe

Fréquence d'administration : **q 3 sem. X 4-6 cycles (poumon)**

Cycle : _____ Jour : _____ à débiter le : _____ Surface corporelle : _____ m²

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Kytril**[®] 1 mg IV + **Decadron**[®] _____ mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).
- Ativan**[®] _____ mg SL avant la chimiothérapie (**Jour 1**).

B. CHIMIOTHÉRAPIE

Jour 1, le _____

- **Gemcitabine** (Gemzar[®]) _____ mg (1 000 mg/m²) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).
- **Carboplatine** (Paraplatin[®]) _____ mg (**ASC=5**)* dans 250 ml D5 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

* Sert uniquement à calculer la dose de départ. Les ajustements de dose se font en tenant compte de la toxicité hématologique (neutrophiles et plaquettes). Contacter l'hématologue traitant en présence de :

- 1) Plaquettes < 100 x 10⁹/L et/ou neutrophiles < 1,5 x 10⁹/L;
- 2) Créatinine > normale, chez un patient dont la créatinine était normale au départ;
- 3) Créatinine normalisée chez un patient dont la créatinine était > normale au départ.

B. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)

Calcul de la dose de départ du carboplatine :

a) Créatinine sérique servant au calcul de la dose de départ au cycle 1 = _____ $\mu\text{mol/L}$ le _____ date

b) Cl_{cr} estimée (ml/min)* : $\frac{(140 - \text{âge}) \times \text{poids (kg)**}}{\text{Cr}_s \times 49} \times 60$ lorsque fonction rénale stable.
Si $\text{Cl}_{\text{cr}} < 30 \text{ ml/min}$: → contacter hémato-oncologue.

Cl_{cr} estimée = _____ ml/min (Cl_{cr} maximum 125 ml/min)

c) Dose de carboplatine = ASC visée X (Cl_{cr} (ml/min) + 25)

* Sexe : F X 0,85

** Standard et maigre : poids réel Obèse : poids de calcul (dosage)

Jour 8, le _____

*(peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette ou dans un autre CH, sans visite médicale obligatoire)
(administrer si les neutrophiles sont $\geq 1,5 \times 10^9/\text{L}$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/\text{L}$)*

- Gemcitabine (Gemzar®) _____ mg ($1\,000 \text{ mg/m}^2$) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- Stemetil® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

Decadron® _____ mg PO bid X _____ jours, à débiter au Jour _____.

Gravol® 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

Kytril® _____ mg PO id q 24 h X _____ jours, à débiter au Jour _____.

Motilium® 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

D. AUTRES

Neupogen® _____ μg SC id X _____ jours, à débiter au Jour _____.

Médecin

Pharmacien

Date