



Parce que rien n'égale la santé !

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

CISPLATINE - DOCETAXEL (Taxotère®)

Clinique d'hémo-oncologie

Date : _____

Durée approximative : 7 h

PROCÉDURE D'ADMINISTRATION ET DE SUIVI INFIRMIER (clinique externe)

Intervention	Heure	Inf
S'assurer que l'usager s'est bien hydraté selon la feuille d'hydratation et qu'il a pris ses comprimés de Decadron®, soit 8 mg la veille au souper et 8 mg le matin au déjeuner. Si oui, aviser la pharmacie que l'usager est apte à recevoir le Taxotère®. Poursuivre le bilan ingesta excréta pour la durée du traitement. Ce protocole s'administre avec 2 pompes volumétriques. Faire uriner l'usager à l'arrivée		
Pouls : _____ T.A. : _____/_____ Resp. : _____ T° : _____ Si 1^{er} Taxotère® et au besoin : SpO₂ _____%.		
Emend 125 mg PO une heure avant le début de la perfusion de Cisplatine .		
Installer un soluté Dextrose - NaCl 0,45 % 1 000 ml avec un « 3 voies » à 500 ml/h.		
Demander à l'usager de mettre une paire de gants et de placer ses doigts dans un bassin de glace recouvert d'une serviette. Déposer des sacs glacés sur les orteils « Ice pack ».		
ALERTE ➤ Placer le coffret de médication d'urgence au chevet. ➤ S'assurer de la présence d'un médecin dans l'aire médicale. ➤ S'assurer de la présence d'une infirmière au chevet de l'usager les 15 premières minutes du début du Taxotère®.		
1) Placer le Taxotère® _____ mg sur la 2^e voie du « 3 voies » (utiliser la 2^e pompe). 2) Ouvrir la voie du côté du Taxotère®. 3) Diminuer la vitesse d'administration du Dextrose 5% -NaCl 0,45 % à 250 ml/h. 4) Administrer simultanément : Taxotère® _____ mg à 250 ml/h. Dextrose 5 % - NaCl 0,45 % à 250 ml/h.		
N. B. : La perfusion de Taxotère® 250 ml se calcule dans le 1 500 ml d'hydratation pré-Cisplatine.		
1) S'assurer que le soluté et la tubulure du Taxotère® sont complètement vides. 2) Fermer la voie du « trois voies » du côté du Taxotère®. 3) Augmenter la vitesse d'administration du Dextrose 5 % - NaCl 0,45 % à 500 ml/h et poursuivre l'hydratation. Pouls : _____ T.A. : _____/_____ SpO₂ _____% (si besoin). 4) Retirer les enveloppements glacés.		

Intervention	Heure	Inf.
Si 1^{er} Taxotère[®], garder en observation une heure avant de débuter autre chimio (seuls les antinauséeux peuvent être donnés. 1) Kytril[®] _____ mg avec Decadron[®] _____ mg (compléter à 20 ml avec NaCl 0,9 %) IV sur la voie B de la pompe 30 minutes avant le début de la perfusion de Cisplatine. 2) Administrer en mode « simultané ».		
ALERTE ➤ S'assurer que l'utilisateur a reçu 1 500 ml d'hydratation avant de débuter la perfusion de Cisplatine. ➤ S'assurer d'un débit urinaire plus grand que 100 ml/h avant de poursuivre, sinon aviser le médecin.		
1) Brancher Cisplatine _____ mg + Mannitol _____ g dans 1 000 ml de NaCl 0,9 % sur la voie B de la pompe à 500 ml/h. 2) Administrer en mode « alterné ».		
1) Terminer l'hydratation avec Dextrose 5 % NaCl 0,45 % à 500 ml/h X 1 h puis enlever le soluté.		
Faire uriner l'utilisateur avant le départ.		

[illegible]

Complété par :				
Date	Heure	Nom en lettres moulées	Signature	Initiales