

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

CISPLATINE avec RT concomitante

(Traitement du cancer du col utérin)

Durée approximative : **4 h**

Hospitalisée ☐

Fréquence d'administration : **q 1 sem. X 6 sem.**

Externe ☐

Sem. : _____ à débiter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. HYDRATATION (concernant le traitement de cisplatine)

☐ Hospitalisée

1. Hydratation à l'unité de soins

NaCl 0,9 % IV à 125 ml/h à débiter au moins 12 h avant le début de la chimiothérapie. Interrompre pendant l'administration de la chimiothérapie. À la fin de la chimiothérapie, reprendre l'hydratation et la poursuivre jusqu'à 16 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

2. Hydratation à domicile, pendant les autres jours du mois

Boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes. Éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola).

☐ Externe

1. Hydratation à domicile

dès la veille du traitement du Jour 1, à débiter vers 12 h et poursuivre jusqu'au matin du traitement du Jour 1 :

- * boire 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes et comptabiliser le nombre de verres bus.
- * éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola) et ne pas comptabiliser ces boissons.

1.2 pendant les 2 jours qui suivent le traitement du Jour 1, soit les Jours 2 et 3 :

- * boire jusqu'à 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

1.3 pendant les autres jours du mois :

- * boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

2. Hydratation à la clinique externe, au Jour 1

NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h. Débiter 1 h avant le début de la perfusion de cisplatine. Interrompre pendant l'administration de la chimiothérapie. À la fin de la chimiothérapie, reprendre l'hydratation et la poursuivre pendant 1 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

B. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Kytril®** 1 mg IV + **Decadron®** 20 mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).

☐ **Ativan®** _____ mg SL avant la chimiothérapie (**Jour 1**).

C. CHIMIOTHÉRAPIE

- **Cisplatine** (Platinol®) _____ mg (40 mg/m^2 ---> max. 70 mg/sem.) dans 1000 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 2h).

Créatinine sérique servant au calcul de la dose de départ au cycle 1 = _____ $\mu\text{mol/L}$ le _____ date

Clairance (Cl_{cr}) estimée = _____ ml/s = _____ ml/min

% dose théorique totale : _____ % au cycle 1

S'assurer d'un débit urinaire $\geq 100 \text{ ml/h}$ avant de débiter le cisplatine.

D. SURVEILLANCE INFIRMIÈRE (concernant le traitement de cisplatine)

- Faire uriner la patiente avant le début de l'hydratation IV.
- Faire la collecte des urines après le début de l'hydratation IV et faire le calcul du volume des urines pour obtenir le débit urinaire (ml/h).

E. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Decadron**® _____ mg PO bid x _____ jours, à débiter au Jour 2, le lendemain du cisplatine.
- **Stemetil**® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

☐ **Gravol**® 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

☐ **Kytril**® _____ mg PO id q 24 h x _____ jours, à débiter au Jour _____.

F. AUTRES

- ☐ **Neupogen**® _____ μg SC id X _____ jours, à débiter au Jour _____.

Médecin

Pharmacien

Date