

## ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : \_\_\_\_\_ (kg) Poids maigre : \_\_\_\_\_ (kg)

Poids de dosage : \_\_\_\_\_ (kg) Taille : \_\_\_\_\_ (cm)

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

## PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

### CISPLATINE avec RT concomitante

(Cancer ORL : tête et cou)

Durée approximative : **5 h**

Hospitalisé

Fréquence d'administration : **q 3 sem. X 3 cycles**

Externe

Cycle : \_\_\_\_\_ à débuter le : \_\_\_\_\_

Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

#### A. HYDRATATION (concernant le traitement de cisplatine)

Hospitalisé

##### 1. Hydratation à l'unité de soins

NaCl 0,9 % IV à 125 ml/h à débuter au moins 12 h avant le début de la chimiothérapie. Interrompre pendant l'administration de la chimiothérapie. À la fin de la chimiothérapie, reprendre l'hydratation et la poursuivre jusqu'à 16 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

##### 2. Hydratation à domicile, pendant les autres jours du mois

Boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes. Éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola).

Externe

##### 1. Hydratation à domicile

dès la veille du traitement du Jour 1, à débuter vers 12 h et poursuivre jusqu'au matin du traitement du Jour 1 :

\* boire 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes et comptabiliser le nombre de verres bus.

\* éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola) et ne pas comptabiliser ces boissons.

##### 1.2 pendant les 2 jours qui suivent le traitement du Jour 1, soit les Jours 2 et 3 :

\* boire jusqu'à 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

##### 1.3 pendant les autres jours du mois :

\* boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

##### 2. Hydratation à la clinique externe, au Jour 1

NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h. Débuter 2 h avant le début de la perfusion de cisplatine. Interrompre pendant l'administration de la chimiothérapie. À la fin de la chimiothérapie, reprendre l'hydratation et la poursuivre pendant 1 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

#### B. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Emend** 125 mg PO 60 minutes avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).

- **Kytril**<sup>®</sup> 1 mg IV + **Decadron**<sup>®</sup> 10 mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).

**Ativan**<sup>®</sup> \_\_\_\_\_ mg SL avant la chimiothérapie (**Jour 1**).

### C. CHIMIOTHÉRAPIE

- Cisplatine (Platinol<sup>®</sup>) \_\_\_\_\_ mg ( $100 \text{ mg/m}^2$ ) dans 1000 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 2h).

Créatinine sérique servant au calcul de la dose de départ au cycle 1 = \_\_\_\_\_  $\mu\text{mol/L}$  le \_\_\_\_\_

Clairance ( $\text{Cl}_{cr}$ ) estimée = \_\_\_\_\_ ml/s = \_\_\_\_\_ ml/min

date

% dose théorique totale : \_\_\_\_\_ % au cycle 1

*S'assurer d'un débit urinaire  $\geq 100 \text{ ml/h}$  avant de débiter le cisplatine.*

### D. SURVEILLANCE INFIRMIÈRE (concernant le traitement de cisplatine)

- Faire uriner le patient avant le début de l'hydratation IV.
- Faire la collecte des urines après le début de l'hydratation IV et faire le calcul du volume des urines pour obtenir le débit urinaire (ml/h).

### E. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- Emend 80 mg PO die au Jour 2 et au Jour 3.
- Decadron<sup>®</sup> \_\_\_\_\_ mg PO bid x \_\_\_\_\_ jours, à débiter au Jour 2, le lendemain du cisplatine.
- Stemetil<sup>®</sup> 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

Graval<sup>®</sup> 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

Kytril<sup>®</sup> \_\_\_\_\_ mg PO id q 24 h x \_\_\_\_\_ jours, à débiter au Jour \_\_\_\_\_.

### F. AUTRES

- Neupogen<sup>®</sup> \_\_\_\_\_  $\mu\text{g}$  SC id X \_\_\_\_\_ jours, à débiter au Jour \_\_\_\_\_.

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Médecin

\_\_\_\_\_  
Pharmacien

\_\_\_\_\_  
Date