

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____(kg) Poids maigre : _____(kg)

Poids de dosage : _____(kg) Taille : _____(cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

COP ou CVP

Lymphome non hodgkinien

ATTENTION : *Si Rituximab (Rituxan[®]) est associé au protocole COP, administrer le Rituximab en premier.*

Durée approximative : **1,25 h**

Hospitalisé

Fréquence d'administration : **q 3 sem. X 6-8 cycles**

Externe

Cycle : _____ à débiter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

Maxeran[®] _____mg

OU

Kytril[®] 1 mg

IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie.

AVEC

Decadron[®] _____mg

Ativan[®] _____mg SL avant la chimiothérapie.

B. CHIMIOTHÉRAPIE

- **Vincristine** (Oncovin[®]) _____mg (1,4 mg/m² → max. 2 mg) ad 20 ml NaCl 0,9 % IV en 5 à 10 min par la tubulure.

- **Cyclophosphamide** (Procytox[®]) _____mg (750-800 mg/m²) dans 250 ml NaCl 0,9% IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

- **Prednisone** 100 mg PO id (au déjeuner) X 5 jours, Jours 1 à 5.

ATTENTION : *Si Rituximab (Rituxan[®]) est associé au protocole COP,*

1. **Au cycle #1 :** le Jour 1 de Prednisone du COP débute avec le COP qui se donne le lendemain du premier Rituximab (Rituxan[®]).

2. **Au cycle #2 et cycles suivants :** le Jour 1 de Prednisone du COP est administré sur place en clinique 1 heure avant le Rituximab (Rituxan[®]). Se référer à la feuille de protocole du Rituximab (Rituxan[®]).

C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Stemetil**[®] 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

- Gravol**[®] 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.
- Kytril**[®] _____ mg PO id q 24 h X _____ jours, à débiter au Jour _____.
- Motilium**[®] 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

D. AUTRES

- Neupogen**[®] _____ µg SC id x _____ jours, à débiter au Jour _____.
- Zyloprim**[®] 300 mg PO id X _____ mois.

Médecin

Pharmacien

Date