

**ORDONNANCES-MÉDICAMENTS**

Poids réel : \_\_\_\_\_ (kg) Poids maigre : \_\_\_\_\_ (kg)

Poids de dosage : \_\_\_\_\_ (kg) Taille : \_\_\_\_\_ (cm)

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

**PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE**

**DACARBAZINE**

(Mélanome métastatique)

Durée approximative : **1 h à 1,5 h**

Hospitalisé

Fréquence d'administration : **q 3 sem.**

Externe

Cycle : \_\_\_\_\_ à débuter le : \_\_\_\_\_

Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE**

- **Emend** 125 mg PO 60 minutes avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).
- **Kytril**® 1 mg + **Decadron**® 10 mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie.
- Ativan**® \_\_\_\_\_ mg SL avant la chimiothérapie.

**B. CHIMIOTHÉRAPIE**

- **Dacarbazine** (DTIC®) \_\_\_\_\_ mg (850-1 000 mg/m<sup>2</sup>) dans 500 ml D5 % IV à 500 ml/h (i. e en 1 h).

**C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE**

- **Emend** 80 mg PO die aux Jours 2 et au Jour 3.
- **Stemetil**® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.
- **Decadron**® \_\_\_\_\_ mg PO bid x \_\_\_\_\_ jours, à débuter au Jour 2.

**Autres** (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

- Gravol**® 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.
- Kytril**® \_\_\_\_\_ mg PO id q 24 h x \_\_\_\_\_ jours, à débuter au Jour \_\_\_\_\_.
- Motilium** 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

**D. AUTRES**

- Neupogen**® \_\_\_\_\_ µg SC id X \_\_\_\_\_ jours, à débuter au Jour \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Médecin

\_\_\_\_\_  
Pharmacien

\_\_\_\_\_  
Date