

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

DOCETAXEL – régime q 3 semaines

- Traitement **palliatif** du cancer du **poumon** métastatique **non à petites cellules**
- Traitement **palliatif** du cancer du **sein** métastatique
- Traitement **adjuvant** et **néo-adjuvant** du cancer du **sein**

Durée approximative : **1 h**

Hospitalisé

Externe

Fréquence d'administration : **q 3 sem.**

Cycle : _____ à débiter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. PROPHYLAXIE À LA DEXAMÉTHASONE

- **Decadron**[®] 8 mg PO bid X 6 doses, à débiter le jour précédant le docetaxel (Taxotere[®]), selon l'horaire suivant :
 - * la veille du traitement : au souper;
 - * le jour du traitement (Jour 1) : au déjeuner et au souper;
 - * le lendemain du traitement (Jour 2) : au déjeuner et au souper;
 - * le surlendemain du traitement (Jour 3) : au déjeuner.

B. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **AUCUN** traitement antiémétique n'est requis **D'EMBLÉE**.

C. CHIMIOTHÉRAPIE

Le docetaxel est administré à la Clinique d'hémo-oncologie.

Docetaxel (Taxotere[®]) _____ mg dans 250 ml D5 % EXCEL IV à 250 ml/h (i. e. en 1 h).
(N. B. : si dose > 185 mg ou si concentration du soluté > 0,74 mg/ml → administrer dans 500 ml de soluté IV à 500 ml/h)

Si hypersensibilité, administrer selon le débit suivant : _____

- 75 mg/m² (Traitement palliatif du cancer du poumon métastatique non à petites cellules)
- 100mg/m² (Traitement palliatif du cancer du sein métastatique)
- 100 mg/m² (Traitement adjuvant et néo-adjuvant du cancer du sein)

D. SURVEILLANCE INFIRMIÈRE

- **Garder au chevet** : une fiole de Benadryl[®], de Decadron[®] et une ampoule d'adrénaline 1 : 1000 (1 mg/ml) pendant l'administration du docetaxel (Taxotere[®]).
- Pouls et T.A. avant de débiter le docetaxel (Taxotere[®]), et au besoin par la suite.
- Aviser le médecin si pouls < 60 et/ou ↓ T.A. significative.
- **Si réaction allergique** :
 - **Cesser la perfusion**
 - **Aviser le médecin**
- **Garder le(la) patient(e) sous observation**, pendant une heure après la fin du premier traitement, et au besoin lors des traitements subséquents s'il y a eu réaction au premier traitement.

E. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Stemetil[®]** 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

F. AUTRES

- Neupogen[®]** _____ µg SC id X _____ jours, à débiter au Jour _____.

Médecin

Pharmacien

Date