

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

FLUDARABINE orale

- Leucémie lymphoïde chronique
- Lymphome non hodgkinien de bas grade
- Macroglobulinémie de Waldenström

Hospitalisé

Externe

Fréquence d'administration : q 4 sem. X 4-6 cycles

Cycle : _____ à débiter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **AUCUN** traitement antiémétique n'est requis D'EMBLÉE.

B. CHIMIOTHÉRAPIE

Jours 1 à 5, du _____ au _____.

(Pour les patients âgés de plus de 70 ans, la durée de traitement peut être de 3 jours).

- **Fludarabine** (Fludara[®]) _____ mg (40 mg/m²) PO id X 5 jours.
(concentration disponible : comprimé de 10 mg).

(Ne pas écraser ni croquer les comprimés)

B. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)

Pour calcul de la dose de départ au cycle 1 : (voir ci-après le tableau des doses recommandées)

Créatinine sérique : _____ $\mu\text{mol/L}$ le _____ date

Clairance (Cl_{cr}) estimée = _____ ml/sec = _____ ml/min

% dose théorique totale : _____ %

Modifications recommandées selon la fonction rénale (réf. GEOQ et BCCA)

Clairance de la créatinine	Dose
> 70 ml/min	100 %
30 – 70 ml/min	50 %
< 30 ml/min	0 %

C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Stemetil**[®] 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

- Gravol**[®] 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.
- Motilium**[®] 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

D. AUTRES

- **Bactrim DS**[®] (*si absence d'allergie*) 1 co. PO id X 3 jours/sem., les lundi, mercredi et vendredi.
prévention du Pneumocystis jirovecii

Neupogen[®] _____ μg SC id x _____ jours, à débiter au Jour _____.

Zyloprim[®] 300 mg PO id X _____ mois.

Médecin

Pharmacien

Date