

## ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : \_\_\_\_\_ (kg) Poids maigre : \_\_\_\_\_ (kg)

Poids de dosage : \_\_\_\_\_ (kg) Taille : \_\_\_\_\_ (cm)

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

## PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

### FLUOROURACILE (en bolus IV)

(Cancer du rectum, stades II et III)

\* **Traitement adjuvant : 4 cycles**, à débiter 4 sem. postopératoires, soit :

**C<sub>1</sub> et C<sub>2</sub>** pré-C<sub>3</sub> de chimio-radiothérapie  
et **C<sub>4</sub> et C<sub>5</sub>** post-C<sub>3</sub> de chimio-radiothérapie

Durée approximative : **0,25 h**

Hospitalisé

Fréquence d'administration : **q 4 sem.**

Externe

Cycle : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

#### A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **AUCUN** traitement antiémétique n'est requis **D'EMBLÉE**.

#### B. CHIMIOTHÉRAPIE

Jours 1 à 5, du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

- **5-Fluorouracile** \_\_\_\_\_ mg IV lentement par la tubulure.

500 mg/m<sup>2</sup> (**pour C<sub>1</sub> et C<sub>2</sub>**) à débiter 4 sem. postop., **pré-C<sub>3</sub> de chimio-radiothérapie**.

450 mg/m<sup>2</sup> (**pour C<sub>4</sub> et C<sub>5</sub>**) à débiter 4 et 8 sem. **post-C<sub>3</sub> de chimio-radiothérapie**.

**En prévention des mucosites et de l'altération du goût** : croquettes de glace « ice chips » X 10 min avant le bolus de 5-FU, pendant le bolus et X 10 min suivant le bolus. Répéter au besoin à domicile.

**En prévention du larmoiement** : application de glace sur les paupières X 10 min avant le bolus de 5-FU, pendant le bolus, et X 10 min suivant le bolus. Répéter au besoin à domicile.

**B. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)**

Jours 1 à 5, du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

Jour 1 : Date/heure : \_\_\_\_\_ Infirmière : \_\_\_\_\_

Jour 2 : Date/heure : \_\_\_\_\_ Infirmière : \_\_\_\_\_

Jour 3 : Date/heure : \_\_\_\_\_ Infirmière : \_\_\_\_\_

Jour 4 : Date/heure : \_\_\_\_\_ Infirmière : \_\_\_\_\_

Jour 5 : Date/heure : \_\_\_\_\_ Infirmière : \_\_\_\_\_

**C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE**

- **Stemetil<sup>®</sup>** 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

**Autres** (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

**Gravol<sup>®</sup>** 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

**Motilium<sup>®</sup>** 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

**D. AUTRES**

- **Imodium<sup>®</sup>** 2 mg. Si diarrhée : 2 co. immédiatement, puis 1 co. après chaque selle diarrhéique (max. 8 co./jour).

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Médecin

\_\_\_\_\_  
Pharmacien

\_\_\_\_\_  
Date