

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

FN

Fludarabine – Mitoxantrone
(Lymphome non hodgkinien)

Durée approximative : **0,75 h (Jour 1)**

Hospitalisé ☐

0,5 h (Jours 2 et 3)

Externe ☐

Fréquence d'administration : **q 4 sem.**

Surface corporelle : _____ m²

Cycle : _____ à débiter le : _____

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

Jour 1, le _____.

☐ **Maxeran**® _____ mg

OU

☐ **Kytril**® _____ mg → IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie.

AVEC

☐ **Decadron**® _____ mg

☐ **Ativan**® _____ mg SL avant la chimiothérapie.

Jour 1 : Date/heure : _____

Infirmière : _____

Jours 2 et 3, les _____ et _____.

☐ **AUCUN traitement antiémétique n'est requis D'EMBLÉE**

☐ **Si intolérance digestive, considérer :**

☐ **Maxeran**® _____ mg

OU

☐ **Kytril**® 1 mg → IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie.

AVEC

☐ **Decadron**® _____ mg

☐ **Ativan**® _____ mg SL avant la chimiothérapie.

Jour 2 : Date/heure : _____

Infirmière : _____

Jour 3 : Date/heure : _____

Infirmière : _____

B. CHIMIOTHÉRAPIE

Jour 1, le _____.

- Mitoxantrone (Novantrone[®]) _____ mg (10 mg/m^2) dans 50 ml NaCl 0,9 % IV à 200 ml/h (i. e. en 0,25 h).

Remarque : jusqu'à ce jour inclusivement,

dose cumulative de mitoxantrone reçue = _____ mg, i.e. _____ mg/m^2

soit _____ % de la dose maximale totale (DMT) de _____ mg calculée à _____ mg/m^2 .

Jour 1 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

- Fludarabine (Fludara[®]) _____ mg (25 mg/m^2) dans 100 ml NaCl 0,9 % IV à 200 ml/h (i. e. en 0,5 h).

Pour calcul de la dose de départ au cycle 1 : (voir ci-après le tableau des doses recommandées)

Créatinine sérique : _____ $\mu\text{mol/L}$ le _____ date

Clairance (Cl_{cr}) estimée = _____ ml/sec = _____ ml/min

% dose théorique totale : _____ %

Modifications recommandées selon la fonction rénale (réf. GEOQ et BCCA)

Clairance de la créatinine	Dose
> 70 ml/min	100 %
30 – 70 ml/min	50 %
< 30 ml/min	0 %

Jour 1 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jours 2 et 3, les _____ et _____

- Fludarabine (Fludara[®]) _____ mg (25 mg/m^2) dans 100 ml NaCl 0,9 % IV à 200 ml/h (i. e. en 0,5 h).

Jour 2 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

Jour 3 : Date/heure : _____ Infirmière : _____

C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- Stemetil[®] 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

☐ Graval[®] 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

☐ Motilium[®] 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

D. AUTRES

- Bactrim DS[®] (si absence d'allergie) 1 co. PO id X 3 jours/sem., les lundi, mercredi et vendredi. *(prévention du Pneumocystis jirovecii)*

☐ Neupogen[®] _____ μg SC id x _____ jours, à débiter au Jour _____.

☐ Zylprim[®] 300 mg PO id X _____ mois.

Médecin

Pharmacien

Date