

## ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : \_\_\_\_\_ (kg) Poids maigre : \_\_\_\_\_ (kg)

Poids de dosage : \_\_\_\_\_ (kg) Taille : \_\_\_\_\_ (cm)

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

## PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

### GDP

#### Gemcitabine – Dexaméthasone - Cisplatine

(Lymphome non hodgkinien réfractaire ou en rechute)

Durée approximative : **5 h (Jour 1)**  
**0,5 h (Jour 8)**

Hospitalisé   
Externe

Fréquence d'administration : **q 3 sem.**

Cycle : \_\_\_\_\_ Jour : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_ Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

#### A. HYDRATATION (concernant le traitement de cisplatine du Jour 1)

Hospitalisé

##### 1. Hydratation à l'unité de soins

NaCl 0,9 % IV à 125 ml/h à débiter au moins 12 h avant le début de la chimiothérapie. Interrompre pendant l'administration de la chimiothérapie. À la fin de la chimiothérapie, reprendre l'hydratation et la poursuivre jusqu'à 16 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

##### 2. Hydratation à domicile, pendant les autres jours du mois

Boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes. Éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola).

Externe

##### 1. Hydratation à domicile

**1.1 dès la veille du traitement du Jour 1**, à débiter vers 12 h et poursuivre **jusqu'au matin du traitement du Jour 1** :

- \* boire 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes et comptabiliser le nombre de verres bus.
- \* éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola) et ne pas comptabiliser ces boissons.

**1.2 pendant les 2 jours qui suivent le traitement du Jour 1, soit les Jours 2 et 3** :

- \* boire jusqu'à 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

**1.3 pendant les autres jours du mois** :

- \* boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

##### 2. Hydratation à la clinique externe, au Jour 1

NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h. Débiter 2 h avant le début de la perfusion de cisplatine. Interrompre pendant l'administration de la chimiothérapie. À la fin de la chimiothérapie, reprendre l'hydratation et la poursuivre pendant 1 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

#### B. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

**Emend** 125 mg PO 60 minutes avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).

- **Kytril**® 1 mg IV + **Decadron**® 10 mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie (**Jour 1**).

**Ativan**® \_\_\_\_\_ mg SL avant la chimiothérapie (**Jour 1**).

### C. CHIMIOTHÉRAPIE

Jour 1, le \_\_\_\_\_

- 1) **Gemcitabine** (Gemzar<sup>®</sup>) \_\_\_\_\_ mg (1 000 mg/m<sup>2</sup>) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).
- 2) **Cisplatine** (Platinol<sup>®</sup>) \_\_\_\_\_ mg (75 mg/m<sup>2</sup>) dans 1 000 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 2 h).

|   |
|---|
| Créatinine sérique servant au calcul de la dose de départ au cycle 1 = _____ µmol/L le _____ date |
| Clairance (Cl <sub>cr</sub> ) estimée = _____ ml/s = _____ ml/min                                 |
| % dose théorique totale : _____ % au cycle 1  |

S'assurer d'un **débit urinaire ≥ 100 ml/h** avant de débiter le cisplatine.

Jours 1 à 4, du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

- **Dexaméthasone** (Decadron<sup>®</sup>) 40 mg PO id (au déjeuner) X 4 jours.

Jour 8, le \_\_\_\_\_

*(peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette, ou dans un autre CH, sans visite médicale obligatoire)  
(administrer si les neutrophiles sont  $\geq 1,5 \times 10^9/L$  et les plaquettes  $\geq 100 \times 10^9/L$ ).*

- **Gemcitabine** (Gemzar<sup>®</sup>) \_\_\_\_\_ mg (1 000 mg/m<sup>2</sup>) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

### D. SURVEILLANCE INFIRMIÈRE (concernant le traitement de cisplatine du Jour 1)

- Faire uriner le patient avant le début de l'hydratation IV.
- Faire la collecte des urines après le début de l'hydratation IV et faire le calcul du volume des urines pour obtenir le débit urinaire (ml/h).

### E. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- Emend** 80 mg PO die au Jour 2 et au Jour 3.
- **Stemetil**<sup>®</sup> 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

**Autres** (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

- Gravol**<sup>®</sup> 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.
- Kytril**<sup>®</sup> \_\_\_\_\_ mg PO id q 24 h x \_\_\_\_\_ jours, à débiter au Jour \_\_\_\_\_.

### F. AUTRES

- Neupogen**<sup>®</sup> \_\_\_\_\_ µg SC id X \_\_\_\_\_ jours, à débiter au Jour \_\_\_\_\_ et X \_\_\_\_\_ jours, à débiter au Jour \_\_\_\_\_.
- Zyloprim**<sup>®</sup> 300 mg PO id X \_\_\_\_\_ mois.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Médecin

\_\_\_\_\_  
Pharmacien

\_\_\_\_\_  
Date