

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____(kg) Poids maigre : _____(kg)

Poids de dosage : _____(kg) Taille : _____(cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

GEMCITABINE - PACLITAXEL lié à l'albumine (Abraxane®)

(1^{ère} intention de l'adénocarcinome métastatique du **pancréas**)

Durée approximative : **1 h**

Fréquence d'administration : **q 1 sem. X 3 sem. / 4**

Hospitalisée

Externe

Cycle : _____ à débuter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Kytril®** 1 mg + **Decadron®** _____ mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie.

B. PRÉMÉDICATION (concernant l'hypersensibilité)

- **AUCUN** traitement n'est requis **D'EMBLÉE**.

C. CHIMIOTHÉRAPIE

Sem. : _____ à débuter le : _____

1) **Paclitaxel lié à l'albumine (Abraxane®)** _____ mg (125 mg/m²) dans un sac vide de PVC IV à _____ ml/h (i. e. en 0,5 h).

2) **Gemcitabine (Gemzar®)** _____ mg (1 000 mg/m²) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

C. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)

Sem. : _____ à débiter le : _____

*(peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette ou dans un autre CH, sans visite médicale obligatoire)
(administrer si les neutrophiles sont $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$)*

1) **Paclitaxel lié à l'albumine** (Abraxane®) _____ mg (125 mg/m^2) dans un sac vide de PVC IV à _____ ml/h (i. e. en 0,5 h).

2) **Gemcitabine** (Gemzar®) _____ mg ($1\ 000 \text{ mg/m}^2$) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

Sem. : _____ à débiter le : _____

*(peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette ou dans un autre CH, sans visite médicale obligatoire)
(administrer si les neutrophiles sont $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$)*

1) **Paclitaxel lié à l'albumine** (Abraxane®) _____ mg (125 mg/m^2) dans un sac vide de PVC IV à _____ ml/h (i. e. en 0,5 h).

2) **Gemcitabine** (Gemzar®) _____ mg ($1\ 000 \text{ mg/m}^2$) dans 250 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

D. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Stemetil**® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

E. AUTRES

Neupogen® _____ ug SC id X _____ jours, à débiter au Jour _____.

Médecin

Pharmacien

Date