

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

ICE

Ifosfamide – Carboplatine – Étoposide

- ☐ Lymphome hodgkinien récidivant
- ☐ Lymphome non hodgkinien récidivant

Durée approximative : **3 jours**

Patient(e) hospitalisé(e)

Fréquence d'administration : **q 2-3 sem.**

Cycle : _____ à débuter le : _____

Surface corporelle : _____ m²

A. HYDRATATION

D5 % - NaCl 0,45 % IV à 125 ml/h à débuter au Jour 1 après l'étoposide. Poursuivre aux Jours 2 et 3 sauf pendant le carboplatine et l'étoposide. Cesser au Jour 3 à la fin de tout le traitement.

B. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Kytril®** 1 mg + **Decadron®** 20 mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie (Jours 1 à 3).

☐ **Ativan®** _____ mg SL avant la chimiothérapie (Jours 1 à 3).

C. CHIMIOTHÉRAPIE

Jour 1, le _____

- **Étoposide** (Vepesid®) _____ mg (100 mg/m²) dans 500 ml NaCl 0,9 % EXCEL IV à 500 ml/h (i. e. en 1 h).

Jour 2, le _____

1) **Étoposide** (Vepesid®) _____ mg (100 mg/m²) dans 500 ml NaCl 0,9 % EXCEL IV à 500 ml/h (i. e. en 1 h).

2) **Carboplatine** (Paraplatin®) _____ mg (**ASC=5**)* dans 250 ml D5 % IV à 500 ml/h (i. e. en 0,5 h).

* Sert uniquement à calculer la dose de départ. Les ajustements de dose se font en tenant compte de la toxicité hématologique (neutrophiles et plaquettes). Contacter l'hématologue traitant en présence de :

1) Plaquettes < 100 x 10⁹/L et/ou neutrophiles < 1,5 x 10⁹/L;

2) Créatinine > normale, chez un patient dont la créatinine était normale au départ;

3) Créatinine normalisée chez un patient dont la créatinine était > normale au départ.

C. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)

Calcul de la dose de départ du carboplatine :

a) Créatinine sérique servant au calcul de la dose de départ au cycle 1 = _____ $\mu\text{mol/L}$ le _____ date

b) Cl_{cr} estimée (ml/min)* : $\frac{(140 - \text{âge}) \times \text{poids (kg)}^{**} \times 60}{\text{Cr}_s \times 49}$ lorsque fonction rénale stable.
Si $\text{Cl}_{\text{cr}} < 30 \text{ ml/min}$: → contacter hémato-oncologue.

Cl_{cr} estimée = _____ ml/min (Clcr maximum 125 ml/min)

c) Dose de carboplatine = ASC visée X (Clcr (ml/min) + 25)

* Sexe : F X 0,85

** Standard et maigre : poids réel Obèse : poids de calcul (dosage)

3) Mesna (Uromitexan®) _____ mg (600 mg/m²) IV en 15 min, **immédiatement avant la perfusion d'ifosfamide-mesna.**

4) Ifosfamide (Ifex®) _____ mg (2500 mg/m²)

+
Mesna (Uromitexan®) _____ mg (2500 mg/m²)

→ dans 1000 ml NaCl 0,9 % IV à 84 ml/h (i. e. en 12 h) X 24 h.
(= 2 solutés consécutifs / 24 h)
(= total de 5 000 mg/m²/j pour chaque médicament)

Jour 3, le _____

1) Étoposide (Vepesid®) _____ mg (100 mg/m²) dans 500 ml NaCl 0,9 % EXCEL IV à 500 ml/h (i. e. en 1 h).

2) Mesna (Uromitexan®) _____ mg (20 mg/kg) PO* q 8 h X 3 doses, **à débiter dès la fin de la perfusion d'ifosfamide-mesna.**

* (diluer dans un demi-verre de boisson gazeuse ou de jus d'orange ou de pomme, et boire au complet)

- Si intolérance au Mesna PO :

☐ Mesna (Uromitexan®) _____ mg (10 mg/kg) IV en 15 minutes via mini-perfuseur q 8 h X 3 doses, **à débiter dès la fin de la perfusion d'ifosfamide-mesna.**

D. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- Stemetil® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

☐ Decadron® _____ mg PO BID X _____ jours, à débiter au Jour 4, le lendemain de la chimiothérapie.

☐ Gravol® 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

☐ Kytril® _____ mg PO id q 24 h X _____ jours, à débiter au Jour _____.

☐ Motilium® 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

E. AUTRES

☐ Neupogen® _____ μg (5 $\mu\text{g/kg}$) SC id X 8 jours, du Jour 5 au Jour 12.

☐ Neupogen® _____ μg (10 $\mu\text{g/kg}$) SC id X 8 jours, du Jour 5 au Jour 12.*

* (au dernier cycle, pour la **procédure de collecte de cellules souches** en vue de la greffe de moelle osseuse).

☐ Zylprim® 300 mg PO id X _____ mois.

Médecin

Pharmacien

Date