

ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : _____ (kg) Poids maigre : _____ (kg)

Poids de dosage : _____ (kg) Taille : _____ (cm)

Diagnostic : _____

Allergies : _____

Renseignements cliniques : _____

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

M - VAC

- Traitement **adjuvant** et **néoadjuvant** du cancer de la vessie
- Traitement **palliatif** du cancer de la vessie

Durée approximative : **0,5 h (Jours 1, 15, 22)**
5 h (Jour 2)

Hospitalisé
Externe

Fréquence d'administration : **q 4 sem.**

Surface corporelle : _____ m²

Cycle : _____ Jour : _____ à débiter le : _____

A. HYDRATATION (concernant le traitement de cisplatine du Jour 2)

- Hospitalisé

1. Hydratation à l'unité de soins

NaCl 0,9 % IV à 125 ml/h à débiter le **Jour 1** au moins 12 h avant le début de la chimiothérapie du **Jour 2**. Interrompre pendant l'administration du cisplatine. À la fin du cisplatine, reprendre l'hydratation et la poursuivre jusqu'à 16 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

2. Hydratation à domicile, pendant les autres jours du mois

Boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes. Éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola).

- Externe

1. Hydratation à domicile

1.1 dès la veille du traitement du Jour 2, à débiter vers 12 h le **Jour 1** et poursuivre **jusqu'au matin du traitement du Jour 2** :

- * boire 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide tels de l'eau, des jus de fruits ou de légumes, des bouillons, des soupes, du lait ou des tisanes et comptabiliser le nombre de verres bus.
- * éviter la consommation importante de boissons alcoolisées et celles contenant de la caféine (café, thé, cola) et ne pas comptabiliser ces boissons.

1.2 pendant les 2 jours qui suivent le traitement du Jour 2, soit les Jours 3 et 4 :

- * boire jusqu'à 10 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

1.3 pendant les autres jours du mois :

- * boire jusqu'à 6 à 8 verres de 250 ml (8 oz) de liquide par jour, comme recommandé plus haut.

2. Hydratation à la clinique externe, au Jour 2

NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h. Débiter 2 h avant le début de la perfusion de cisplatine. Interrompre pendant l'administration du cisplatine. À la fin du cisplatine, reprendre l'hydratation et la poursuivre pendant 1 h après la fin de la perfusion de cisplatine.

B. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **Emend** 125 mg PO 60 minutes avant le début de la chimiothérapie (**Jour 2**).
- **Kytril**® 1 mg IV + **Decadron**® 10 mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie (**Jour 2**).
- Ativan**® _____ mg SL avant la chimiothérapie (**Jour 2**).

C. CHIMIOTHÉRAPIE

Jour 1, le _____

- **Methotrexate** _____ mg (30 mg/m²) IV lentement par la tubulure.

Jour 2, le _____

- 1) **Vinblastine** (Velbe[®]) _____ mg (3 mg/m²) IV lentement par la tubulure.
- 2) **Doxorubicine** (Adriamycin[®]) _____ mg (30 mg/m²) IV lentement par la tubulure.

Remarque : jusqu'à ce jour inclusivement,

dose cumulative de doxorubicine reçue = _____ mg, i. e. _____ mg/m²
soit _____ % de la dose maximale totale (DMT) de _____ mg calculée à
_____ mg/m².

- 3) **Cisplatine** (Platinol[®]) _____ mg (70 mg/m²) dans 1 000 ml NaCl 0,9 % IV à 500 ml/h (i. e. en 2 h).

Créatinine sérique servant au calcul de la dose de départ au cycle 1 = _____ µmol/L le _____ date

Clairance (Cl_{cr}) estimée = _____ ml/s = _____ ml/min

% dose théorique totale : _____ % au cycle 1

S'assurer d'un **débit urinaire ≥ 100 ml/h** avant de débiter le cisplatine.

Jour 15, le _____ Jour 22, le _____

(peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette, ou dans un autre CH (si cycle sans radiothérapie), sans visite médicale obligatoire) (administrer si les neutrophiles sont $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$).

- **Methotrexate** _____ mg (30 mg/m²) IV lentement par la tubulure.
- **Vinblastine** (Velbe[®]) _____ mg (3 mg/m²) IV lentement par la tubulure.

D. SURVEILLANCE INFIRMIÈRE (concernant le traitement de cisplatine du Jour 2)

- Faire uriner le patient avant le début de l'hydratation IV.
- Faire la collecte des urines après le début de l'hydratation IV et faire le calcul du volume des urines pour obtenir le débit urinaire (ml/h).

E. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Emend** 80 mg PO die au Jour 3 et au Jour 4 (le lendemain et le surlendemain du cisplatine).
- **Decadron**[®] _____ mg PO bid x _____ jours, à débiter au Jour 3, le lendemain du cisplatine.
- **Stemetil**[®] 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) :

Gravol[®] 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.

Kytril[®] _____ mg PO id q 24 h x _____ jours, à débiter au Jour _____.

F. AUTRES

Neupogen[®] _____ µg SC id X _____ jours, à débiter au Jour _____.

Médecin

Pharmacien

Date