

**ORDONNANCES-MÉDICAMENTS**

Poids réel : \_\_\_\_\_(kg) Poids maigre : \_\_\_\_\_(kg)

Poids de dosage : \_\_\_\_\_(kg) Taille : \_\_\_\_\_(cm)

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

**PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE**

**PACLITAXEL lié à l'albumine (Abraxane®) – régime q 3 semaines**

(Cancer métastatique du **sein** chez les patientes intolérantes au docetaxel et/ou paclitaxel)

Durée approximative : **0,5 h**

Fréquence d'administration : **q 3 sem.**

Hospitalisée

Externe

Cycle : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE ET PRÉMÉDICATION (concernant l'hypersensibilité)**

- **AUCUN** traitement n'est requis D'EMBLÉE.

**B. CHIMIOTHÉRAPIE**

- **Paclitaxel lié à l'albumine (Abraxane®)** \_\_\_\_\_mg (260 mg/m<sup>2</sup>) dans un sac vide de PVC IV à \_\_\_\_\_ ml/h (i. e. en 0,5 h).

**C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE**

- **Stemetil®** 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

**D. AUTRES**

**Neupogen®** \_\_\_\_\_ug SC id X \_\_\_\_\_jours, à débiter au Jour \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Médecin

\_\_\_\_\_  
Pharmacien

\_\_\_\_\_  
Date