

## ORDONNANCES-MÉDICAMENTS

Poids réel : \_\_\_\_\_ (kg) Poids maigre : \_\_\_\_\_ (kg)

Poids de dosage : \_\_\_\_\_ (kg) Taille : \_\_\_\_\_ (cm)

Diagnostic : \_\_\_\_\_

Allergies : \_\_\_\_\_

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_

### PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

#### VINORELBINE (monothérapie)

- Cancer récidivant de l'**ovaire**
- Cancer métastatique du **poumon** non à petites cellules
- Cancer métastatique du **sein**

Durée approximative : **0,25 h**

Hospitalisé

Fréquence d'administration :

Externe

- q 1 sem. X 2 sem./3** (cancer de l'**ovaire**) **ET**  
(cancer du **poumon** non à petites cellules)

- q 1 sem. sans interruption, si possible** (cancer du **sein**)

#### SINON

- q 1 sem. X 3 sem./4** OU  **q 1 sem. X 2 sem./3**

Cycle : \_\_\_\_\_ Sem. : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

Surface corporelle : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

#### A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE

- **AUCUN** traitement antiémétique n'est requis **D'EMBLÉE**.

#### B. CHIMIOTHÉRAPIE

Sem. : \_\_\_\_\_ à débiter le : \_\_\_\_\_

- **Vinorelbine** (Navelbine®) \_\_\_\_\_ mg ad 25 ml NaCl 0,9 % IV lentement, en 5 à 10 min par la tubulure.
  - 25 mg/m<sup>2</sup> (**cancer de l'ovaire**)
  - 25 à 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du sein**)
  - 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du poumon**)

## B. CHIMIOTHÉRAPIE (suite)

Sem. : \_\_\_\_\_ à débuter le : \_\_\_\_\_

*(Peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette ou dans un autre CH, sans visite médicale obligatoire. Administrer si les neutrophiles sont  $\geq 1,5 \times 10^9/L$  et les plaquettes  $\geq 100 \times 10^9/L$ )*

- **Vinorelbine** (Navelbine®) \_\_\_\_\_ mg ad 25 ml NaCl 0,9 % IV lentement, en 5 à 10 min par la tubulure.
  - 25 mg/m<sup>2</sup> (**cancer de l'ovaire**)
  - 25 à 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du sein**)
  - 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du poumon**)

Sem. : \_\_\_\_\_ à débuter le : \_\_\_\_\_

*(Peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette ou dans un autre CH, sans visite médicale obligatoire. Administrer si les neutrophiles sont  $\geq 1,5 \times 10^9/L$  et les plaquettes  $\geq 100 \times 10^9/L$ )*

- **Vinorelbine** (Navelbine®) \_\_\_\_\_ mg ad 25 ml NaCl 0,9 % IV lentement, en 5 à 10 min par la tubulure.
  - 25 mg/m<sup>2</sup> (**cancer de l'ovaire**)
  - 25 à 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du sein**)
  - 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du poumon**)

Sem. : \_\_\_\_\_ à débuter le : \_\_\_\_\_

*(Peut être prescrit à l'avance et administré au CSSS de Rimouski-Neigette ou dans un autre CH, sans visite médicale obligatoire. Administrer si les neutrophiles sont  $\geq 1,5 \times 10^9/L$  et les plaquettes  $\geq 100 \times 10^9/L$ )*

- **Vinorelbine** (Navelbine®) \_\_\_\_\_ mg ad 25 ml NaCl 0,9 % IV lentement, en 5 à 10 min par la tubulure.
  - 25 mg/m<sup>2</sup> (**cancer de l'ovaire**)
  - 25 à 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du sein**)
  - 30 mg/m<sup>2</sup> (**cancer du poumon**)

## C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE

- **Stemetil**® 10 à 20 mg PO ou IR q 4-6 h si nausées ou vomissements.

**Autres** (pour ajustement du traitement antinauséux) :

- Gravol**® 50 mg PO ou 100 mg IR q 6 h si nausées ou vomissements.
- Motilium**® 10 mg PO tid, soit ½ h à 1 h ac.

## D. AUTRES

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Médecin

\_\_\_\_\_  
Pharmacien

\_\_\_\_\_  
Date