



Parce que rien n'égale la santé !

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

XELOX (Capécitabine – Oxaliplatine)

Clinique d'hémato-oncologie

Date : _____

Durée approximative : 3 h 30

PROCÉDURE D'ADMINISTRATION ET DE SUIVI INFIRMIER (clinique externe)

Intervention	Heure	Inf.
1) Installer un soluté Dextrose 5 % 500 ml à 30 ml/h. 2) Kytril ® _____ mg avec Decadron ® _____ mg (compléter à 20 ml de NaCl 0,9 %) sur la voie B de la pompe 30 minutes avant le début de la chimiothérapie. 3) Administrer en mode « simultané ».		
Perfusion de gluconate de calcium _____ g plus sulfate de magnésium _____ g. ➤ Non prescrit : ☐ ➤ Prescrit : ☐ 1 ^{re} heure : _____ 2 ^e heure : _____		
1) Brancher Oxaliplatine _____ mg sur la voie B de la pompe à 250 ml/h. 2) Administrer en mode « alterné ».		
1) Rincer avec 50 ml de Dextrose 5 % à 500 ml/h. 2) Enlever soluté.		
ALERTE Aviser l'usager que le froid peut entraîner des signes de neuropathie.		

Notes de l'infirmière

[illegible]

Complété par :				
Date	Heure	Nom en lettres moulées	Signature	Initiales