

Dans la région du Bas St-Laurent, l'avortement médical par médication avec le Mifegymiso est disponible à la clinique planning de Rivière-du-Loup et de Rimouski. Si votre grossesse est de moins de 9 semaines selon votre échographie, et que votre condition répond aux critères, vous pourrez choisir entre l'IVG (interruption volontaire de grossesse) chirurgicale ou par médicament.

À noter que le choix de la méthode pour interrompre votre grossesse vous appartient. Par contre, dans certaines situations (en plus des contre-indications médicales), il est possible que nous ne puissions pas vous offrir d'IVG médical (voyage/déplacement prochain, degré d'anxiété élevé, capacité de suivre la procédure, disponibilité du personnel, etc.).

Avortement chirurgical versus médical

Dépliant produit par la clinique planning /ITSS/IVG
CLSC de Rivière-du-Loup
22, rue St-Laurent
Rivière-du-Loup G5R 4W5
Tél. : (418) 867-2642 poste 140

Source: Clinique Morgentaler
<https://montrealmorgentaler.ca/avortementmedical.php>

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

Québec 

Québec 

IVG chirurgical par méthode DAC (dilatation-aspiration-curetage)

IVG par médication (Mifegymiso et Misoprostol)

Âge de gestation en semaines	De 7 à 14 semaines de grossesse.	Jusqu'à 9 semaines de grossesse. (63 jours de gestation ou moins)
Lieu	Offert à l'hôpital de Rivière-du-Loup et de Rimouski.	Dans un rayon de 60 minutes d'un service d'urgence.
Nombre de rencontres	<ul style="list-style-type: none"> • Rencontre préparatoire : ½ journée (TS, infirmière et médecin) • Journée de l'intervention (au total environ 2h de présence) • Suivi médical 3-6 semaines post-IVG 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencontre préparatoire : ½ journée (TS, infirmière et médecin) • Journée de la procédure (environ 1h) • Suivi et prise de sang/écho dans 7-14 jours (peut nécessiter une 2e journée de procédure pour administrer une seconde fois la médication et un autre suivi 7-14 jours plus tard) • Suivi médical 3-4 semaines post-IVG (au besoin)
Échographie de dating	Souvent recommandé, mais selon la situation peut ne pas être obligatoire.	Obligatoire.
Durée de la procédure	Normalement entre 5-8 minutes.	De quelques heures à quelques jours après la prise de la 2e médication (Misoprostol) Habituellement, les saignements les plus importants se manifestent dans les 2 à 4 heures suivant la prise du Misoprostol.
Efficacité	Plus de 99%	95 à 99%
Accompagnement	Oui, pour le retour à la maison, car nous ne pouvez pas conduire.	Il est fortement recommandé que quelqu'un puisse être présent avec vous à la maison.
Douleur/analgésie	Légère à modérée, normalement bien tolérée car sous sédation consciente. Si douleur plus sévères, possibilité de donner d'autres analgésies, donc douleur est plus facile à contrôler.	Modéré à forte, peut durer quelques heures. Prise d'analgésie par la bouche, mais douleur plus difficile à contrôler.
Effets secondaires de la médication les plus fréquentes	Somnolence, possibilité de nausées légères, étourdissements.	Nausée, vomissement, diarrhée, frissons, douleurs abdominales sous formes de crampes/contractions, maux de tête, fatigue, bouffée de chaleur, saignements vaginaux prolongés.
Saignement	Parfois aucun saignement, ou léger à modéré pouvant durer jusqu'à 3 semaines post-IVG.	Modéré à intense, puis diminution pour une période de 3 semaines et parfois plus sous forme de spotting.
Absentéisme	La ½ journée de préparation et le jour de l'intervention.	La ½ journée de préparation, et lors de la prise de la médication, parfois 2-3 jours.
Avantages	Intervention rapide avec un taux de réussite plus élevé, moins de saignement, meilleur gestion de la douleur, personnel médical sur place.	Présence d'un proche lors de la procédure si désiré, intimité, moins invasif.
Désavantages	Pas de personne significative durant la procédure, moins d'autonomie : une date est (imposée) et accompagnement nécessaire pour le retour à la maison.	Procédure plus longue, taux de réussite un peu plus faible, gestion de la douleur plus difficile, plus de saignement, pas de présence de personnel médical.