

Description

L'acétate de médroxyprogestérone, connu sous le nom de Depo-Provera, est un contraceptif injectable dérivé d'une hormone naturelle, la progestérone. Elle a été synthétisée en 1954 et est utilisée depuis 1960. Depuis le mois d'avril 1997, le Depo-Provera est officiellement accepté au Canada pour usage contraceptif.

Mode d'action

L'injection du produit dans un muscle provoque une augmentation rapide du taux de progestérone dans le sang. Cette concentration sanguine demeure suffisante pour exercer un effet contraceptif pendant 14 semaines

Il y a 3 modes d'action :

- Il empêche l'ovulation
- Il rend l'intérieur de l'utérus inapte à recevoir l'ovule fécondé
- Il modifie la glaire du col utérin

Efficacité

Son efficacité est de 99,7 % et se compare à celle de la ligature des trompes. Pour être efficace, les injections doivent être administrées régulièrement à toutes les 11 à 13 semaines.

Indications

Le Depo-Provera constitue une option intéressante surtout dans les situations suivantes :

- Échecs répétés des autres méthodes contraceptives
- Intolérance ou contre-indications aux pilules contraceptives
- Oublis fréquents de pilules contraceptives
- Fumeuses de plus de 35 ans
- Lorsque l'aménorrhée (absence de menstruations) peut apporter un soulagement de la douleur menstruelle ou de la tension prémenstruelle
- Lorsque l'aménorrhée offre un avantage sur le plan médical ou sur celui de l'hygiène
- Utilisation à long terme de médicaments qui diminuent l'efficacité des pilules contraceptives (ex : certains médicaments contre l'épilepsie)
- Endométriose
- Femme qui allaite

Il existe deux contre-indications absolues à l'utilisation du Depo-Provera, soit :

- La grossesse
- Les saignements utérins inexplicables

Il ne faut pas choisir cette méthode si on désire un retour rapide à la fertilité.

Mode d'administration

Le Depo-Provera doit être injecté dans le bras ou la fesse toutes les 11 à 13 semaines.

Si la première injection est faite dans les 5 premiers jours de la menstruation l'efficacité est immédiate. Si l'injection est donnée après cette période, il faut attendre une semaine pour que la protection soit efficace.

Si une injection est administrée plus de 14 semaines après l'injection précédente, il faudra attendre une semaine avant que la protection soit à nouveau efficace et utiliser un autre moyen contraceptif durant cette période; bien sûr, s'il y a eu relation sexuelle non protégée après la 14^e semaine, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse avant d'injecter le médicament et proposer une pilule du lendemain. L'injection peut être faite par un médecin ou par une infirmière.

Coût

Une injection coûte environ 45 \$, mais le Depo-Provera est couvert par le régime d'assurances médicaments du Québec et les assurances privées.

Effets secondaires

Les troubles menstruels (saignements irréguliers non prévisibles mais rarement abondants) constituent l'effet secondaire le plus fréquent. Ils disparaissent habituellement après quelques mois d'utilisation pour faire place à l'aménorrhée ou absence de règles. La méthode est efficace qu'il y ait saignement ou non.

Les cycles menstruels se rétablissent dans les 6 mois suivant la dernière injection dans la majorité des cas; toutefois, l'absence de règles peut durer jusqu'à 12 à 18 mois. Il faut tout de même utiliser une autre méthode contraceptive efficace dès la fin de la 14^e semaine suivant l'injection si une grossesse n'est pas désirée.

La prise de poids constitue un autre effet secondaire fréquent (moyenne de 2,5 kg pour la première année d'utilisation); elle est consécutive à une stimulation de l'appétit. Par contre, on a noté une diminution de poids chez 20% des femmes. Le médicament peut provoquer d'autres effets secondaires comparables à ceux rencontrés avec les contraceptifs oraux: maux de tête, douleur ou malaise abdominal, fatigue, nausée, diminution du désir sexuel, sensibilité des seins, changement d'humeur, dépression.

Le depo-provera protège contre le cancer de l'endomètre (intérieur de l'utérus) et le cancer de l'ovaire.

Certaines utilisatrices peuvent subir une légère perte osseuse. Pour éviter cet effet secondaire, il faut préconiser l'activité physique, la consommation de produits laitiers et la cessation du tabac. Il est à noter que cette perte osseuse est complètement réversible après un arrêt de 2 à 3 ans.

Il n'y a aucun avantage à limiter le nombre d'années d'utilisation de cette méthode si elle satisfait pleinement la femme.

Retour à la fertilité

La fertilité revient généralement dans les 6 à 9 mois suivant la dernière injection et coïncide avec le retour du cycle menstruel normal.

Parfois, ce délai peut être plus long soit jusqu'à 18 mois. Après cette période, la fertilité n'est plus diminuée peu importe le nombre d'années d'utilisation.

Conclusion

Le Depo-Provera est une méthode contraceptive efficace et sécuritaire qui peut convenir à plusieurs femmes. Elle constitue un choix intéressant pour toutes celles qui présentent des contre-indications, des intolérances ou tout simplement des insatisfactions aux autres méthodes.

Révisé Janvier 2014

DEPO- PROVERA

Considérations générales
Mode d'action
Efficacité
Indications
Mode d'administration
Coût
Effets secondaires
Retour à la fertilité

Clinique de planning

CSSSR-N, 150 avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 5T1
Tél. : (418) 724-8578
www.planningchrr.com